## 펜타닐: 알아야 할 진실

## 미국 내



18세부터 44세까지, 과다복용이 가장 큰 사망 원인입니다



펜타닐 과다복용이 사망의 핵심 원인입니다. 더 많은 전국 및 주별 데이터를 확인하세요.



더 많은 전국 및 주별데이터를 확인하세요.

## 워싱턴주에서

펜타닐을 포함한 합성 오피오이드가 오피오이드 사망을 폭발적으로 증가시키고 있습니다.

> 오피오이드 관련 사망 총 828건 이 중 337명(40.7%)이 펜타닐과 같은 합성 오피오이드로 인한 사망

2023 오피오이드 관련 총 사망자 2,819명 이 중 2,642명(93.7%)이 펜타닐 등 합성 오피오이드로 인한 사망

규모에 상관없이, 워싱턴주의 모든 카운티는 펜타닐의 영향을 받고 있습니다. 2021~2023년 기준:

**킹 카운티** 230만명

2019

**26.06** 인구 10만 명당 합성 오피오이드 사망자 수 **피어스 카운티** 915,000명

27.09 인구 10만 명당 합성 오피오이드 사망자 수 **그레이스 하버 카운티** 77,000명

> **44.73** 인구 10만 명당 합성 오피오이드 사망자 수

**펜도릴 카운티** 14.000명

**33.9** 인구 10만 명당 합성 오피오이드 사망자 수

## 날록손은 생명을 구합니다.

날록손(나르칸이라고도 합니다)은 오피오이드 과다복용을 되돌릴 수 있는 약물입니다. 워싱턴주 전역의 지정 약국 및 지역 사회 기관에서 무료로 받을 수 있습니다.

항상 날록손을 소지하세요. 과다복용이 의심되는 상황을 보면 즉시 911에 전화하세요. 그런 다음 날록손을 환자의 코에 분사하면 됩니다. 상대방이 오피오이드를 사용하지 않았더라도 날록손은 안전하게 사용할 수 있습니다.



가까운 무료 날록손 배포처 찾기



